

INFORMAZIONI E REGOLE DA SEGUIRE PER LA COLONSCOPIA
PREPARAZIONE CON PLENVU: Per potere prenotare una colonscopia bisogna che il paziente effettui i seguenti esami, i cui referti dovrà esibire in fare di prenotazione, P.T.T., Tempo di Protrombina, Fibrinogeno ed Emocromo. Sospendere terapia antiaggregante e anticoagulante, previo colloquio con il Cardiologo di fiducia.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE IN BASE ALL'ORARIO DELLA COLONSCOPIA

COLONSCOPIA FINO ALLE ORE 14

3 giorni prima dell'esame

INDICAZIONI ALIMENTARI -Non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).

Il giorno prima dell'esame

INDICAZIONI ALIMENTARI -Si può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta idrica con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa

Ore 19.00–19.30

PREPARAZIONE INTESTINALE CON PLENVU -Bere la dose 1 di PLENVU lentamente nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 1 (indicativamente 19.30 – 20.00)

PREPARAZIONE INTESTINALE CON PLENVU-Bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) lentamente nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari e si sente lo stimolo della sete.

ore 22,00 – 22,30

Ore 22.00–22.30

Bere la dose 2 di PLENVU lentamente nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 2

PREPARAZIONE INTESTINALE CON PLENVU-Bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) lentamente nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari e si sente lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'inizio dell'esame

INDICAZIONI ALIMENTARI Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

ESAMI PRELIMINARI DA ESEGUIRE PER SOTTOPORSI A COLONSCOPIA

ELETTROCARDIOGRAMMA (eseguito negli ultimi 3 mesi)

Emocromo, AP, PTT, Fibrinogeno

RACCOMANDAZIONI


In caso di assunzione di antiaggreganti piastrinici e di anticoagulanti bisogna sospendere l'assunzione previo contatto col cardiologo di fiducia o col l'endoscopista di riferimento

ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE DELLE DUE DOSI

PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi.


Dose 1: una bustina singola

Dose 2: due bustine diverse, A e B,
incollate tra di loro (da utilizzarsi insieme)



Come preparare PLENVU Dose 1


1. Aprire la scatola ed estrarre la bustina "Dose 1".
2. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
3. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Come preparare PLENVU Dose 2

1. Estrarre la "Dose 2" dalla scatola; versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

NOTA BENE: NON INVERTIRE la sequenza delle dosi

AVVERTENZE

- In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte la settimana) chiedere consiglio al medico per valutare l'aggiunta di un lassativo osmotico a base di Macrogol nei 2-3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di PLENVU in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

CONTROINDICAZIONI

PLENVU è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi = favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).